

コロラド州：小麦作柄と気象状況

2003年4月1日

2003年3月30日現在：

コロラド州の2003年産冬小麦は、2003年3月1日付け農務省の発表では、作付面積2,600,000エーカー（2002年産作付け面積：2,350,000エーカー）となっている。

2003年冬季の降雪は平年以下であった。3月中旬までの気温は平年を多少上回り推移したが、3月後半に向かい気温は平年並みとなった。3月中旬より降水（降雨と降雪）が州東部平原にあり、土壌水分の改善が見られたが、昨年来の早魃状態を改善するにはさらに降水が必要な状態と報告された。

冬小麦は3月上旬より休眠から覚め生育を開始した。州全体としては殆ど的小麦がFairからGoodと評価されている。

土壌水分：(2003年3月30日現在)

	Very Short	Short	Adequate	Surplus
Topsoil (%)	10	22	66	2
Subsoil (%)	36	37	26	1

小麦作柄状況：(2003年3月30日現在)

	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
Winter wheat (%)	6	13	33	45	3

2003年冬小麦作付け品種：(2003年1月15日発表)

	2001 Crop	2002 Crop	2003 Crop
Arkon	24.4	25.3	22.3
Prairie Red	11.5	13.9	16.0
Tam 107	24.9	13.6	13.0
Jagger	2.9	6.7	7.7
Above	-	-	3.8
Yumar	4.6	4.8	3.6
Other	31.7	35.7	33.6
Total	100.0%	100.0%	100.0%

当該作柄レポートに関するご質問等は下記までにお問い合わせ致します。

小川正晃 : Email ogawa.max@omicnet.com