

カンサス州：小麦作柄と気象状況

2003年3月3日

2003年2月概況：

2月の気温は概してマイルドと報告された。西部地方では最高気温は61～64度F、最低気温は0～マイナス6度Fであった。南東地区では70度Fを記録した。全州に降水（降雨及び降雪）が有り土壌水分を多少改善したが、降水量としては地区間で大きな差があった。州の南東地区では2インチ以上を記録し、西部3地区（NW、WC、SW）では0.3～0.8インチ程度であった。州全体のTopsoil水分の状況は16%でVery short、44%：Short、37%：Adequate、Surplus：3%の状態であり、先月より改善された。小麦の生育状況は78%の圃場で凍害は無しと報告され、19%の圃場でLight damage、3%にてModerate damageと報告された。風害の状況は、82%にて無し、18%にてLight～moderateとの報告であった。今後の冬小麦の正常な生育の為には、春先の十分な降雨が必要な状態である。

土壌水分状況：(2月末の状況)

Topsoil

	NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Month	Year
Very Short (%)	37	28	26	25	10	4	19	10	-	16	27	19
Short (%)	63	56	43	63	54	33	62	41	-	44	50	44
Adequate (%)	-	16	31	12	25	63	19	49	91	37	23	36
Surplus (%)	-	-	-	-	11	-	-	-	9	3	-	1

Subsoil

	NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Month	Year
Very Short (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Short (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adequate (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surplus (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Month とは Last Month を意味し、Year とは Last year を意味する)

小麦作柄状況：(2月末日現在)

	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
Wheat (%)	6	20	45	26	3

Source : Kansas Agricultural Statistics Service