

ノース・ダコタ州：小麦作柄と気象状況

2003年3月3日

2002年12月から2003年2月の気象概況

2002年12月：平年以下の降雪量であり、多くの圃場が露出しており、強風による表土の侵食が警戒された。1月5日現在の州平均 Snow cover の深さは3.2インチ（2002年1月5日は3.3インチ）であった。北中央地区（NC）が最も深く5.6インチであったが、南西地区（SW）、南中央地区（SC）では0.7～0.8インチであった。12月の平均気温は平年を6度F上回った。

2003年1月：12月に続き平年より降水量（降雪）が少なく、一部で土壌の風による侵食が報告された。2月2日現在の州平均 Snow cover の深さは2.7インチ（2002年2月3日：2.9インチ）であった。北中央地区（NC）では5.5インチ、最も少ない地区は南西地区（SW）の0.5インチであった。平均気温は州東部を除き平年を数度上回った。

2003年2月：2月の気温は平年を下回り、州北部では平均気温は平年の11度F、南部では5～9度平年を下回った。降雪は昨年を上回ったが平年以下であった。3月2日現在の州平均 Snow cover の深さは3.0インチで昨年（2002年3月3日：0.6インチ）より良好であった。しかし南西地区（SW）、南中央地区（SC）では0.8～0.9インチと報告されていた。同地区の一部で強風による土壌の侵食が発生した。

参考データ：

シーズン平均気温と降水量（シーズン：2002年3月29日～11月5日）：

| District | Ave. Temperature | | Seasonal Precipitation, 3/29～11/5 | | |
|----------|------------------|---------------|-----------------------------------|-------|---------------|
| | Past week | Depart Normal | Past week | Total | Depart Normal |
| | Degree F | | Inches | | |
| NW (1) | 21 | -15 | 0.00 | 10.71 | -2.69 |
| NC (2) | 23 | -12 | 0.02 | 11.85 | -3.48 |
| NE (3) | 26 | -11 | 0.10 | 18.50 | +3.83 |
| WC (4) | 22 | -17 | 0.01 | 10.67 | -3.51 |
| C (5) | 26 | -12 | 0.04 | 12.16 | -2.83 |
| EC (6) | 28 | -10 | 0.12 | 15.89 | -0.51 |
| SW (7) | 24 | -15 | 0.04 | 7.71 | -5.87 |
| SC (8) | 23 | -16 | 0.04 | 7.18 | -6.13 |
| SE (9) | 29 | -10 | 0.02 | 14.49 | -1.37 |

当該作柄レポートへのご質問・ご意見は下記宛てにお願い致します。

小川正晃：E-mail ogawa.max@omicnet.com